

کد کنترل

121

A



121A

صبح پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۶



در زمینه مسائل علمی باید دنیال قله بود.
مقام معظم رهبری

دفترچه شماره ۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون اختصاصی (سراسری) ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
نوبت اول - اردیبهشت سال ۱۴۰۳

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخگویی	ملاحظات
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

- ۱- مقادیر a ، $1+2a$ و $5-a$ به ترتیب جملات متوالی یک دنباله حسابی هستند. اگر a جمله نخست این دنباله باشد، جمله نهم کدام است؟

(۱) $2/75$ (۲) $4/25$ (۳) $12/25$ (۴) $14/75$

- ۲- اگر P گزاره درست، q گزاره نادرست و r گزاره دلخواه باشد، گزاره $(p \Rightarrow r) \Rightarrow (r \Rightarrow q)$ هم‌ارز منطقی کدام گزاره است؟

(۱) r (۲) T (۳) $\sim r$ (۴) $\sim T$


- ۳- نقاط $(-4, 3)$ و $(-4, -1/5)$ روی یک تابع درجه دوم واقع هستند. مجموع صفرهای این تابع کدام است؟

(۱) $3/2$ (۲) $3/4$ (۳) $5/2$ (۴) $5/4$

- ۴- اختلاف ریشه‌های معادله $x^2 + 2kx + 5 = 0$ برابر $\frac{4}{3}k$ است. مقدار $\left[\frac{k^2}{2} \right]$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۴

- ۵- در شکل زیر، فاصله نقطه A از مبدأ مختصات کدام است؟



(۱) $2\sqrt{5}$

(۲) $3\sqrt{6}$

(۳) $4\sqrt{3}$

(۴) $5\sqrt{2}$

- ۶- اگر $f(x) = x^2 - [x]$ و $f(af(\sqrt{5})) = 2$ باشد، کدام می‌تواند مقدار a باشد؟

(۱) $1/3$ (۲) $-1/3$ (۳) $1/5$ (۴) $-1/5$

- ۷- برای چند مقدار صحیح و یک رقمی a ، جواب معادله $\sqrt{x} + \sqrt{x-a} = a$ ، عددی صحیح است؟

(۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷


۸- به ازای کدام مقدار a ، نمودار تابع وارون تابع $f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + 1$ خط $y - x = -10$ را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع می‌کند؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۱۲ (۳) ۹ (۴) ۵

۹- اگر $\log_2(x^2 + 2x + 4) + \log_2(x - 2) = 3$ باشد، مقدار $\log_{\sqrt{2}} x$ کدام است؟


- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{4}{3}$ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰- نمودار تابع $y = c + \log_5(ax + b)$ به صورت زیر است. حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟



- (۱) $-\frac{2}{5}$
(۲) $-\frac{3}{5}$
(۳) $-\frac{1}{10}$
(۴) $-\frac{3}{10}$

۱۱- در شکل زیر، مثلث ABC متساوی الساقین است. مقدار $\tan \alpha$ کدام است؟



- (۱) $-\frac{2}{5}$
(۲) $-\frac{2}{5}$
(۳) $-\frac{\sqrt{7}}{2}$
(۴) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

۱۲- حاصل عبارت $(3 \cos 4x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} \cos x)$ به ازای $x = \frac{\pi}{12}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۱۳- حاصل عبارت $\frac{\sin^4 \alpha + 4 \cos^2 \alpha}{1 + \cos^2 \alpha} - \frac{\cos^4 \alpha + 4 \sin^2 \alpha}{1 + \sin^2 \alpha}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\cos^2 \alpha$ (۴) $\sin^2 \alpha$

۱۴- مجموع جواب‌های معادله $\cos^2 x + \sin^2 x = 0$ در بازه $[-3\pi, \pi]$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $-\pi$ (۳) -3π (۴) -4π

۱۵- مجموع مقادیر حدهای چپ و راست تابع $f(x) = \frac{x-2}{x^2 - [x^2]}$ در نقطه $x = 2$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۱ (۴) صفر

۱۶- اگر $f(x) = \frac{4}{x^2 + 2x - 3}$ و $g(x) = \frac{1}{x-1}$ باشد، نقطه تلاقی مجانب‌های نمودار تابع $f - g$ کدام است؟

- (۱) $(-1, 1)$ (۲) $(-3, 0)$ (۳) $(3, 1)$ (۴) $(1, 0)$

۱۷- تابع $f(x) = \begin{cases} (1-a)[x] + (3a^2 - 1)[-x] & x \notin \mathbb{Z} \\ b \sin(\frac{\pi}{a}) & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$ روی مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۸- اگر $f(x) = \sqrt{x+8} - \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+8} + \sqrt{x}}$ باشد، حاصل عبارت $f'(1)g(1) - g'(1)f(1)$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۲

۱۹- به ازای چند مقدار صحیح m ، تابع $y = \frac{mx+2}{x-1+m}$ روی بازه $(1, +\infty)$ نزولی است؟ ($m \neq 2$)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۰- به ازای هر مقدار حقیقی و ناصفر a ، تابع $f(x) = \begin{cases} bx+c & x < a \\ \frac{1}{x} & x \geq a \end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ مشتق‌پذیر است. مقدار ac کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) -۲ (۴) ۲

۲۱- خط مماس بر منحنی $y = x^3 + ax^2 + bx - 1$ در نقطه $(-1, -4)$ از منحنی عبور می‌کند. حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{5}$ (۲) $\frac{4}{5}$ (۳) $\frac{6}{5}$ (۴) $\frac{8}{5}$

۲۲- یک کودک ۳ مکعب مستطیل یکسان با رنگ‌های مختلف دارد. او به چند طریق می‌تواند با روی هم قرار دادن یک یا چند تا از آنها یک ستون بسازد؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۷۸ (۳) ۶۶ (۴) ۴۲

۲۳- دو تاس را با هم پرتاب می‌کنیم. با کدام احتمال عدد ظاهر شده یکی از تاس‌ها اول بوده و مجموع آنها حداقل ۶ است؟

- (۱) $\frac{2}{9}$ (۲) $\frac{5}{9}$ (۳) $\frac{11}{18}$ (۴) $\frac{13}{18}$

۲۴- میانگین دسته اول با ۴ داده برابر میانگین دسته دوم با ۵ داده است. یک داده از دسته اول را با یک داده از دسته دوم جابه‌جا می‌کنیم به طوری که میانگین دسته‌های جدید مجدداً برابر خواهند شد. اگر واریانس دسته اول قبل از جابه‌جایی داده‌ها برابر $\frac{1}{25}$ باشد، واریانس دسته اول بعد از جابه‌جایی داده‌ها کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{25}$ (۲) $\frac{2}{5}$ (۳) $\frac{3}{75}$ (۴) $\frac{4}{5}$


۲۵- دانش‌آموزان دو مدرسه A و B در یک آزمون شرکت کرده‌اند. ۶۰ درصد از دانش‌آموزان مدرسه A و ۷۰ درصد از دانش‌آموزان مدرسه B در آزمون قبول شده‌اند. اگر تعداد دانش‌آموزان مدرسه A، $\frac{3}{4}$ تعداد دانش‌آموزان مدرسه B باشد و فردی به تصادف از قبول شدگان انتخاب شود، با کدام احتمال این فرد از مدرسه A است؟

- (۱) $\frac{9}{16}$ (۲) $\frac{7}{16}$ (۳) $\frac{5}{8}$ (۴) $\frac{3}{8}$

۲۶- فاصله کدام نقطه از سه ضلع مثلث ABC، همواره یکسان است؟


- (۱) تلاقی سه ارتفاع (۲) تلاقی سه میانه (۳) تلاقی سه نیمساز (۴) تلاقی سه عمود منصف

۲۷- در شکل زیر، $\hat{DAE} = \hat{ACD}$ و $BE = DC$ است. اندازه DC کدام می‌تواند باشد؟



- (۱) ۸
(۲) ۷
(۳) ۶
(۴) ۵

۲۸- در مربع شکل زیر، نقطه M وسط ضلع AB و $\widehat{BCE} = \widehat{AMF}$ است. مساحت مثلث سایه خورده کدام است؟




(۱) $\frac{4}{75}$

(۲) $\frac{4}{25}$

(۳) $\frac{3}{75}$

(۴) $\frac{3}{25}$

۲۹- در شکل زیر، $\widehat{ABC} = \widehat{CED} = 90^\circ$ است. اگر $AD = 3$ ، $EF = 4$ و $DF = 1$ باشد، اندازه BC کدام است؟




(۱) $4\sqrt{6}$

(۲) $10\sqrt{2}$

(۳) $6\sqrt{3}$

(۴) $8\sqrt{5}$

۳۰- در شکل زیر، طول وتر AB کدام است؟



(۱) ۱۶

(۲) ۱۷

(۳) ۱۸

(۴) ۱۹

۳۱- در کدام تبدیل، همواره جهت شکل حفظ می شود؟

(۴) تجانس

(۳) انتقال

(۲) دوران

(۱) بازتاب

۳۲- در یک مثلث متساوی الساقین، اندازه قاعده ۱۶ و اندازه میانه وارد بر آن، نصف قاعده است. اندازه میانه نظیر هر

ساق کدام است؟

(۴) $4\sqrt{10}$

(۳) $6\sqrt{5}$

(۲) $\frac{7}{2}\sqrt{10}$

(۱) $\frac{11}{2}\sqrt{5}$

۳۳- اگر A و B دو ماتریس مربعی مرتبه ۲ و $AB = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل ضرب درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی

ماتریس $B - \frac{3}{2}A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -4 & 4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) -۳ (۳) ۹ (۴) -۹

۳۴- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، سطر سوم ماتریس A^3 کدام است؟

- (۱) $\begin{bmatrix} -10 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ (۲) $\begin{bmatrix} -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ (۳) $\begin{bmatrix} 7 & 5 & -5 \end{bmatrix}$ (۴) $\begin{bmatrix} 7 & 5 & -2 \end{bmatrix}$

۳۵- کانون‌های یک بیضی نقاطی با طول $x = 3$ و $x = -3$ روی محور x ها هستند. اگر خروج از مرکز بیضی $\frac{1}{3}$ باشد،

طول قطر کوچک این بیضی کدام است؟

- (۱) $15\sqrt{2}$ (۲) $12\sqrt{2}$ (۳) $8\sqrt{2}$ (۴) $6\sqrt{2}$

۳۶- یک متوازی‌السطوح توسط بردارهای $\vec{a} = (2, -3, 4)$ ، $\vec{b} = (-1, 2, 3)$ و $\vec{c} = (3, -2, 1)$ تولید شده و صفحه P

شامل بردارهای b و c است. اندازه ارتفاع این متوازی‌السطوح عمود بر صفحه P ، کدام است؟

- (۱) $\sqrt{5}$ (۲) $5\sqrt{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۴) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

۳۷- یک عدد پنج رقمی با استفاده از دو عدد متوالی کمتر از ۱۰ نوشته شده است. اگر مجموع ارقام آن عدد به صورت

$23n + 1$ باشد، چند عدد پنج رقمی با این ویژگی وجود دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۶

۳۸- اگر m کوچکترین عضو مثبت مجموعه $\{407r + 592s \mid r, s \in \mathbb{Z}\}$ باشد، مجموع ارقام m کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۷ (۳) ۱۰ (۴) ۱۱

۳۹- حداقل چند عدد از مجموعه $\{20, 21, 22, \dots, 100, 101, 102, \dots, 199, 200\}$ انتخاب کنیم تا مطمئن شویم حداقل دو عدد از آنها دارای مقسوم علیه مشترک غیر یک هستند؟

- (۱) ۹ (۲) ۸ (۳) ۷ (۴) ۶

۴۰- در گراف G ، $|V(G)| = ۸$ و $|E(G)| = ۲۴$ است. کمترین مقدار ممکن برای $\delta(G)$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

محل انجام محاسبات



کلید سوالات آزمون اختصاصی (سراسری) سال ۱۴۰۳ - نوبت اول

نام مجموعه				نام دفترچه				کد دفترچه			
۱ - ریاضی				شماره ۱ - شماره ۲ - ویژه فرهنگیان				۱۶۱A - ۱۶۲A - ۱۶۱A			
گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
۱	۱۶۱	۴	۸۱	۱	۴۱	۴	۱	۳	۴۲	۲	۸۲
۳	۱۶۲	۱	۸۲	۲	۴۳	۲	۸۳	۴	۴۴	۲	۸۴
۴	۱۶۳	۲	۸۳	۳	۴۵	۲	۸۵	۴	۴۶	۴	۸۶
۴	۱۶۴	۳	۸۴	۲	۴۷	۴	۸۷	۲	۴۸	۴	۸۸
۲	۱۶۵	۲	۸۵	۳	۴۹	۲	۸۹	۱	۵۰	۳	۹۰
۴	۱۶۶	۳	۸۶	۴	۵۱	۳	۹۱	۳	۵۲	۱	۹۲
۲	۱۶۷	۴	۸۷	۱	۵۳	۲	۹۳	۳	۵۴	۱	۹۴
۳	۱۶۸	۱	۸۸	۴	۵۵	۳	۹۵	۴	۵۶	۴	۹۶
۱	۱۶۹	۲	۸۹	۲	۵۷	۴	۹۷	۴	۵۸	۱	۹۸
۴	۱۷۰	۴	۹۰	۳	۵۹	۳	۹۹	۱	۶۰	۴	۱۰۰
۳	۱۷۱	۳	۹۱	۴	۶۱	۲	۱۰۱	۱	۶۲	۳	۱۰۲
۱	۱۷۲	۴	۹۲	۱	۶۳	۱	۱۰۳	۳	۶۴	۴	۱۰۴
۲	۱۷۳	۳	۹۳	۲	۶۵	۱	۱۰۵	۴	۶۶	۳	۱۰۶
۴	۱۷۴	۴	۹۴	۱	۶۷	۱	۱۰۷	۱	۶۸	۴	۱۰۸
۲	۱۷۵	۳	۹۵	۳	۶۹	۱	۱۰۹	۲	۷۰	۲	۱۱۰
۱	۱۷۶	۴	۹۶	۴	۷۱	۳	۱۱۱	۴	۷۲	۱	۱۱۲
۳	۱۷۷	۴	۹۷	۲	۷۳	۴	۱۱۳	۳	۷۴	۲	۱۱۴
۲	۱۷۸	۱	۹۸	۳	۷۵	۲	۱۱۵	۲	۷۶	۱	۱۱۶
۴	۱۷۹	۲	۹۹	۴	۷۷	۲	۱۱۷	۱	۷۸	۳	۱۱۸
۴	۱۸۰	۲	۱۰۰	۱	۷۹	۳	۱۱۹	۴	۸۰	۱	۱۲۰
۱	۱۴۱	۱	۱۰۱	۱	۸۱	۲	۱۲۰	۲			
۳	۱۴۲	۴	۱۰۲	۳	۸۲	۱					
۳	۱۴۳	۳	۱۰۳	۱	۸۳	۳					
۴	۱۴۴	۲	۱۰۴	۴	۸۴	۲					
۱	۱۴۵	۱	۱۰۵	۱	۸۵	۱					
		۴	۱۰۶	۳	۸۶	۳					
		۱	۱۰۷	۴	۸۷	۴					
		۳	۱۰۸	۱	۸۸	۱					
		۲	۱۰۹	۳	۸۹	۳					
		۱	۱۱۰	۴	۹۰	۴					
		۴	۱۱۱	۲	۹۱	۲					
		۱	۱۱۲	۴	۹۲	۴					
		۳	۱۱۳	۱	۹۳	۱					
		۴	۱۱۴	۳	۹۴	۳					
		۲	۱۱۵	۴	۹۵	۴					
		۳	۱۱۶	۱	۹۶	۱					
		۱	۱۱۷	۳	۹۷	۳					
		۲	۱۱۸	۴	۹۸	۴					
		۴	۱۱۹	۲	۹۹	۲					
		۲	۱۲۰	۴	۱۰۰	۴					

سؤال ١ - گزینه ٣...

$$-m\hbar^2 + m\hbar + 1 = -1 - m \rightarrow m\hbar^2 - (m+1)\hbar - (m+1) = 0$$

$$\xrightarrow{\Delta < 0} (m+1)^2 + 4m(m+1) < 0 \rightarrow (m+1)(\Delta m + 1) < 0$$

$$\rightarrow -\frac{1}{\Delta} \leq m \leq -1 \xrightarrow{\mathbb{Z}} \{-1\}$$

سؤال ٢ - گزینه ٢...


$$f\left(\frac{1}{4}\right) = -9 \rightarrow g^{-1}(a) = \frac{1}{4} \rightarrow g\left(\frac{1}{4}\right) = a \rightarrow a = -\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{8}$$

سؤال ٣ - گزینه ١..

$$\alpha\beta = \frac{\beta}{\gamma\Delta\alpha} \rightarrow \alpha^2 = \frac{1}{\gamma\Delta} \rightarrow \alpha = \pm \frac{1}{\Delta}$$

$$\beta > \alpha \rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{\Delta} \\ \beta = 1 \end{cases}$$

$$n=\alpha : \gamma\Delta\alpha + \frac{1}{\gamma\Delta} + \alpha + \beta = 0 \rightarrow \Delta\alpha + \beta = 0 \rightarrow \beta = -\Delta\alpha$$




سؤال ۴ - گزینه ۲...

$$-f < \frac{-1}{c-n} < 0 \rightarrow -f < \frac{1}{n-c} < 0$$

$$\rightarrow n-c < \frac{-1}{f} \xrightarrow{N} n=1, 2$$

سؤال ۵ - گزینه ۲...



$$(a,b) = (0, \frac{1}{2}) \rightarrow a+b = \frac{1}{2}$$

سؤال ٦ - گزینه ٢...

$$f(1)=0: 1 + C \times e^{a+b} = 0 \rightarrow C \times e^{a+b} = -1 \xrightarrow{+} e^b = e \rightarrow b=1$$
$$f(0)=\frac{2}{e}: 1 + C \times e^a = \frac{2}{e} \rightarrow C \times e^a = \frac{-1}{e}$$

$$f(-1) = 1 + C \times e^{a-b} = 1 + \frac{C \times e^a}{e^b} = 1 + \frac{C \times e^a}{e} = 1 + \frac{-1/e}{e} = 1 - \frac{1}{e^2} = \frac{e^2 - 1}{e^2}$$

سؤال ٧ - گزینه ٢..

$$y(1) = \frac{10}{4} - \frac{9}{2} = 1$$

$$\rightarrow y^{-1}(1) = 1 \rightarrow a + a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

سؤال ٨ - گزینه ٤...

$$\tan \alpha = \frac{-1/\Delta}{\gamma} = -\frac{\gamma}{\Delta} \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha = -\frac{\Delta}{\gamma}$$

سؤال ٩ - گزینه ٤..

$$\frac{-r \cos 41^\circ - r \sin 22^\circ}{-\sin 22^\circ - \cos 41^\circ} = \frac{-\Delta \sin 22^\circ}{-r \sin 22^\circ} = \frac{\Delta}{r} = r/\Delta$$

سؤال ١٠ - گزینه ٢...

$$r \sin n \cos n (1 - r \sin n) = 0 \begin{cases} \sin n = 0 \rightarrow n = 0 \\ \cos n = 0 \rightarrow n = \pm \frac{\pi}{2} \\ \sin n = \frac{1}{r} \rightarrow n = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

سؤال ١١ - گزینہ ...ا..

$$\frac{2\pi}{|a|} = \frac{\sqrt{\pi}}{4} - \frac{9\pi}{4} = \pi \rightarrow |a| = 2$$

$$T = \frac{2\pi}{|\frac{1}{a}|} = 2\pi |a| = 4\pi$$

سؤال ۱۲ - گزینه ۳..

$$f(1^+) = \frac{8+0}{2} = 4$$

$$f(1^-) = \frac{4+2}{2} = 3$$

سؤال ١٣ - گزینه ٤...

$$\frac{a + \epsilon \times (-1)}{0^-} = -\infty \Rightarrow a - \epsilon > 0 \Rightarrow a > \epsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \frac{1}{\epsilon}} \left[\frac{n}{a} - n \right] = \left[-\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\epsilon} \right] = -1$$

سؤال ۱۴ - گزینه ۱...

$[x^2 - ax]$ در این نهایت نقطه
ناپایه است $\rightarrow b=0 \rightarrow f(x) = -2a$

$$\rightarrow \frac{a}{f(b)} = \frac{a}{-2a} = -\frac{1}{2}$$

سؤال ١٥ - گزینه ٢..

$$\frac{n+\Delta}{V} = \frac{an-1}{c_{n+1}} \rightarrow cn^2 + 17n + \Delta = Van - V$$

$$\rightarrow cn^2 + (17 - Va)n + 17 = 0 \rightarrow n^2 + \frac{17 - Va}{c}n + 17 = 0$$

$$\text{ریشه ها مساوی} \rightarrow \frac{17 - Va}{c} = -17 \rightarrow 17 - Va = -17 \rightarrow a = 4$$

$$f(x) = (x+1)^2(ax+1)$$

$$\frac{f(0) - f(-1)}{0 - (-1)} = -11 \rightarrow 1^2 \times 1 - 2^2(-a+1) = -11 \rightarrow 1(1-a) = 12$$

$$\rightarrow 1-a = \frac{12}{1} \rightarrow a = -\frac{11}{1}$$

$$f'(x) = 2(x+1) \times 2x(-\frac{11}{1}+1) + (x+1)^2 \times \frac{-11}{1}$$

$$f'(-2a) = f'(1) = 2 \times 2 \times 2 \times \frac{1}{1} + 1 \times \frac{-11}{1} = 12 - 11 = 1$$

سؤال ١٧ - گزینه ا..

$$y = x^3 - 12x + 2 \rightarrow y' = 3x^2 - 12$$

x	-2	2
y'	+ 0 - 0 +	
y		
	max	min

$$y_{\min} = y(2) = 1 - 24 + 2 = -21$$

سؤال ١٨ - گزینه ...

$$S = 2x \sqrt{4-x} = 2 \sqrt{4x^2 - x^4}$$

$$\rightarrow S_{\max} = 2 \times 2 \times 1 = 4$$

$$(4x^2 - x^4)' = 0 \rightarrow 8x - 4x^3 = 0 \rightarrow x = 2$$

سؤال ۱۹ - گزینه ۴..

$$11, 22, 22, a, a$$

۱۱ دارد : 1 2 9 0 29

$$11 + 22 + 22 + 2a = 5 \times 22 \rightarrow 2a = 22 \rightarrow a = 11$$

$$\text{میانگین بزرگ‌تر از جابجایی} = \frac{42 + 22}{2} = \frac{64}{2} = 32$$

سؤال ۲۰ - گزینه ۳..

$$\boxed{\text{گنه}} \text{ ی، ر، و، آ} \rightarrow 4! \cdot 2! = 24 \times 2 = 48$$

سؤال ٢١ - گزینه ٢..


$$1 - \frac{7 + 2 \times 5}{27} = 1 - \frac{17}{27} = \frac{10}{27}$$

سؤال ٢٢ - گزینه ا..


$$\frac{4}{10} \times \frac{4}{10} + \frac{9}{10} \times \frac{8}{10} = \frac{16+72}{100} = \frac{88}{100} = \frac{22}{25} = 0.88$$

سؤال ٢٣ - گزینه ٢..

$(1, -\frac{1}{r})$: وسط قطر



سؤال ٢٤ - گزینه ٣...




$$\triangle BAF \sim \triangle ECF \rightarrow \frac{BF}{EF} = \frac{AF}{CF}$$

$$\rightarrow \frac{y}{x} = \frac{x+y}{x} \rightarrow x(x+y) = yx$$

$$\rightarrow x = y \rightarrow AF = x + y = 12$$

سؤال ٢٥ - گزینه ا..



$$x = \frac{11}{2}$$

$$\frac{11}{2} = \frac{y + \frac{11}{2}}{y + 11} \rightarrow \frac{11}{2} = \frac{2y + 11}{y + 11}$$

$$\rightarrow 11y + 121 = 2y + 11 \rightarrow 9y = 110 \rightarrow y = \frac{110}{9}$$


سؤال ٢٦ - گزینه ٢..

$$B = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{14}}{\sqrt{2} + \sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \rightarrow B = \frac{1 + \sqrt{7}}{\sqrt{2} + \sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{2} - \sqrt{7}}{\sqrt{2} - \sqrt{7}} = \frac{-2 + 2\sqrt{7}}{14 - 2} = \frac{2\sqrt{7} - 2}{9}$$

$$\rightarrow 2B = \frac{2\sqrt{7} - 2}{9} = \sqrt{7} - 1 \rightarrow 2B + 1 = \sqrt{7}$$

سؤال ۲۷ - گزینه ۴...

$$\underbrace{n(A \cap B)}_{12x} = \underbrace{2n(A - B)}_{4x} = \underbrace{4n(B - A)}_{2x}$$



$$\xrightarrow{+} 19x = 8V \rightarrow x = 2$$

$$\rightarrow n(A) = 14x = 28$$

$$d' = b_r - b_l = (a_r + f) - (a_l + f) = a_r - a_l = d$$

$$\rightarrow b_n = a_n + f \rightarrow b_n - a_n = f$$

$$f(1): 1+2a = a + \Delta \rightarrow a = 1$$

$$f(a) = f(1) = 1a + \Delta = 21 + \Delta = 22$$

سؤال ٣٠ - گزینه

$$4y + 2x = 9 \rightarrow m = -\frac{2}{4} \rightarrow m' = \frac{4}{2}$$

$$(0, 4) \rightarrow d': y = \frac{4}{2}x + 4$$

$$O(-\frac{4}{2}, -\frac{9}{2})$$

$$\rightarrow -\frac{9}{2} = -\frac{9}{2} + 4 = \frac{4}{2}$$

$$\rightarrow a = -\frac{4}{2}$$

