

کاربرد مشتق

فصل

اکسترم‌های تابع

درس اول

بهینه‌سازی

درس دوم

math-pilevar.ir

تهیه کننده : رقیه پيله ور - دبیر ریاضی ناحیه دو اردبیل



برای تماشای ویدیوهای آموزشی ریاضی ۳ تجربی (همین جزوه) می توانید به سایت

math-pilevar.ir یا math-pilevar.com مراجعه کنید.



درس اول



اکسترم های تابع





یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق

در فصل اول، تعریف تابع صعودی و تابع نزولی را دیدیم. در اینجا می خواهیم ارتباط علامت مشتق یک تابع را با صعودی یا نزولی بودن آن تابع بررسی کنیم.

فعالیت

جدول زیر را در نظر بگیرید. در این جدول ضابطه و نمودار چند تابع ارائه شده است که از قبل با آنها آشنا هستیم. همچنین یکنوایی این تابع ها مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، مشتق هر کدام از این تابع ها، تعیین علامت شده است. جدول را کامل کنید.

علامت مشتق	تابع مشتق	یکنوایی تابع	نمودار تابع	ضابطه تابع
f' همواره مثبت است	$f'(x) = 2$	تابع f در $\mathbb{R}$ اکیداً صعودی است		$f(x) = 2x - 1$
g' همواره ... است <i>منفی</i>	$g'(x) = -1$	تابع g در $\mathbb{R}$ اکیداً ... است <i>نزولی</i>		$g(x) = -x + 1$

$h(x) = \sqrt{x}$		تابع h در $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی است	$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	h' در $(0, +\infty)$... است مثبت
$u(x) = -\sqrt{x}$		تابع u در $[0, +\infty)$ اکیداً نزولی است	$u'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$	u' در $(0, +\infty)$ ، همواره منفی است
$k(x) = x^2$		تابع k در $(-\infty, 0)$ اکیداً نزولی و در $(0, +\infty)$ اکیداً صعودی است.	$k'(x) = 2x$	k' در $(-\infty, 0)$ منفی و در $(0, +\infty)$ مثبت است.
$l(x) = -x^2$		اکیداً صعودی $(-\infty, 0)$ اکیداً نزولی $(0, +\infty)$	$l'(x) = -2x$	l' در $(-\infty, 0)$ مثبت در $(0, +\infty)$ منفی است

با بررسی جدول بالا، توضیح دهید که چه رابطه‌ای بین علامت مشتق تابع در یک بازه و یکنوایی تابع در آن بازه وجود دارد.

اکیداً صعودی $\Rightarrow$ مشتق مثبت

اکیداً نزولی $\Rightarrow$ مشتق منفی

از فصل قبل می‌دانیم که مشتق هر تابع در یک نقطه، با شیب خط مماس بر نمودار تابع در آن نقطه برابر است. تابع زیر را در نظر بگیرید:



ملاحظه می‌شود که:


- الف) در بازه $(1, 7)$ که f اکیداً صعودی است، شیب خط‌های مماس بر نمودار f ، مثبت است؛ بنابراین در این بازه علامت f' ... است.
 ب) در بازه $(7, 12)$ که تابع اکیداً نزولی است، شیب خط‌های مماس بر نمودار f ، منفی است؛ بنابراین در این بازه علامت f' منفی است.
 پ) در بازه $(12, +\infty)$ که تابع، مقدار ثابت دارد، مقدار f' برابر صفر است.

math-pilevar.ir

مطلب فوق برای توابع مشتق‌پذیر همواره درست است که آن را به شکل زیر بیان می‌کنیم:

آزمون یکنوایی تابع

- الف) در یک بازه از دامنه f اگر مقدار f' موجود و مثبت باشد، آنگاه f در آن بازه اکیداً صعودی است.
 ب) در یک بازه از دامنه f اگر مقدار f' موجود و منفی باشد، آنگاه f در آن بازه اکیداً نزولی است.
 پ) در یک بازه از دامنه f اگر مقدار f' موجود و برابر صفر باشد، آنگاه f در آن بازه تابعی ثابت است.



بنابراین برای مشخص کردن بازه‌های مربوط به صعودی بودن یا نزولی بودن تابع f ، کافی است مانند مثال زیر، f' را تعیین علامت کنیم.

مثال ۱: تابع $f(x) = x^3 - 3x$ در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در کدام بازه‌ها اکیداً نزولی است؟

حل: f' را به دست آورده و آن را تعیین علامت می‌کنیم.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
بازه		$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
علامت f'		+	-	+
یکنوایی f	$-\infty$	اکیداً صعودی	اکیداً نزولی	اکیداً صعودی $+\infty$

نمودار تابع f مربوط به مثال قبل را رسم کرده‌ایم. آن را با جدول مقایسه کنید.

اکسترم‌های نسبی تابع

در نمودار این تابع، نقاط به طول ۱ و -۱ را که صفرهای تابع f' هستند مورد توجه قرار دهید. اهمیت این نقاط در این مثال از این جهت است که در هر یک از آنها، رفتار تابع از نظر صعودی یا نزولی بودن عوض شده است (جدول ملاحظه شود). اگر این دو نقطه را به ترتیب A و B بنامیم، آنگاه A نقطهٔ ماکزیمم نسبی f و B نقطهٔ مینیمم نسبی آن است.

تعریف: گوئیم تابع f در نقطه‌ای به طول c ماکزیمم نسبی دارد، هرگاه یک

همسایگی از c مانند $I \subseteq D_f$ باشد که برای هر $x \in I$ داشته باشیم $f(c) \geq f(x)$.

در این حالت $f(c)$ مقدار ماکزیمم نسبی تابع f نامیده می‌شود.

همچنان که گفته شد، تابع مثال قبل در نقطه $A(-1, 2)$ ماکزیم نسبی دارد و مقدار ماکزیم نسبی تابع برابر ۲ می باشد. مینیم نسبی به روش مشابه تعریف می شود.



تعریف: گوئیم تابع f در نقطه ای به طول c مینیم نسبی دارد، هرگاه یک همسایگی از c مانند I باشد که برای هر $x \in I \subseteq D_f$ داشته باشیم $f(c) \leq f(x)$. در این حالت $f(c)$ را مقدار مینیم نسبی تابع f می نامیم.

در مثال قبل مقدار مینیم نسبی تابع چقدر است؟ -۲

تذکر: نقاط ماکزیم و مینیم یک تابع را نقاط اکسترم آن تابع هم می گوئیم. در تابع مثال قبل، نقاط A و B اکسترم های نسبی تابع هستند.

کار در کلاس

نوع اکسترم های نسبی هر یک از توابع زیر را در نقاط مشخص شده تعیین کنید و جدول ها را کامل کنید.



الف $f(x) = ||x| - 2|$, $x \in [-5, 3]$ ب $g(x) = -x^2 - 1$, $x \in [-1, 2]$

نقطه	نوع اکسترم نسبی	مقدار اکسترم نسبی	مقدار مشتق
A	نه max نسبی و نه min نسبی	-	-
B	min نسبی	۰	$f'(-2)$ موجود نیست
C	max نسبی	۲	$f'(0)$ موجود نیست
D	min نسبی	۰	$f'(2)$ موجود نیست
E	نه max نسبی و نه min نسبی	-	-

نقطه	نوع اکسترم نسبی	مقدار اکسترم نسبی	مقدار مشتق
A	نقطه اکسترم نسبی نیست	-	-
B	max نسبی	-۱	$g'(0)$ برابر صفر است
C	نه max نسبی و نه min نسبی	-	-


نقاط بحرانی تابع

حال این سؤال پیش می‌آید که در چه نقاطی از دامنه تابع f باید به دنبال اکسترم‌های نسبی آن باشیم؟ همان‌گونه که در تابع‌های قبلی دیده می‌شود، جواب عبارت است از نقاطی از دامنه f که f' در آنها تعریف نشده باشد و همچنین نقاطی که مقدار f' در آنها برابر صفر است. به لحاظ اهمیت این دو دسته از نقاط، شایسته است که نامی برای خود داشته باشند؛ آنها را نقاط بحرانی تابع می‌نامیم:

تعریف: نقطه به طول c از دامنه تابع f را یک نقطه بحرانی برای این تابع می‌نامیم هرگاه $f'(c)$ برابر صفر باشد یا $f'(c)$ موجود نباشد.

نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع زیر را در نظر بگیرید. دیده می‌شود که خط مماس بر نمودار f در این نقاط به صورت افقی، یعنی با شیب صفر است. از آنجا که مشتق تابع در یک نقطه، برابر شیب خط مماس بر منحنی تابع در آن نقطه است، لذا در این تابع داریم:


$$f'(6) = 0, \quad f'(9) = 0$$



بحران $\Rightarrow$ اکسترم

این مطلب در مورد نقاط اکسترم نسبی هر تابع مشتق‌پذیر، درست است. قضیه زیر را در این مورد بیان می‌کنیم.

قضیه: اگر تابع f در نقطه به طول c ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد و $f'(c)$ موجود باشد، آنگاه $f'(c) = 0$. به عبارت دیگر، هر نقطه اکسترم نسبی تابع، یک نقطه بحرانی آن است.



۱ الف) با رسم نمودار تابع $f(x) = |x-2|$ ، نشان دهید که f در $x=2$ مینیمم نسبی دارد.


ب) آیا $f'(2)$ موجود است؟ چرا؟ خیر، نفقه گرفته ای است.

پ) آیا $x=2$ طول نقطه بحرانی تابع است؟ چرا؟ بله، چون در این نقطه مشتق ناپذیر است.

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & x \geq 2 \\ -x+2 & x < 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 2 \\ -1 & x < 2 \end{cases}$$

$$f'_+(2) \neq f'_-(2)$$



۲ نمودار تابع $f(x) = -x^3 + 3x$ را رسم کرده ایم.


الف) طول های نقاط اکسترمم نسبی f را تعیین کنید. -1 , 1

ب) می دانیم این تابع در $\mathbb{R}$ مشتق پذیر است. ریشه های معادله $f'(x) = 0$ ، یعنی طول های نقاط بحرانی تابع را به دست آورید.

پ) با توجه به الف و ب، درستی قضیه قبل را در مورد این تابع بررسی کنید.

$$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0$$

$$-3x^2 = -3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$



۳ تابع با ضابطه $f(x) = -x^2 + 2x + 2$ را در نظر بگیرید. f همواره مشتق پذیر است.
الف) $f'(x)$ را به دست آورید.

ب) ریشه معادله $f'(x) = 0$ را محاسبه کنید تا طول نقاط بحرانی تابع به دست آید.

پ) با رسم نمودار سهمی، تحقیق کنید که آیا نقطه اکسترمم f منطبق بر نقطه بحرانی آن است؟ بله

$$f'(x) = -2x + 2 = 0 \Rightarrow -2x = -2 \Rightarrow x = 1$$


$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2(-1)} = 1$$

0	1	2
2	3	2

math-pilevar.ir

از مثال های قبل، این سؤال مطرح می شود که آیا صفرهای تابع مشتق، همواره طول نقاط اکسترمم نسبی تابع را به دست می دهند؟ با وجود آنکه جواب این سؤال در مورد برخی از تابع های مورد بحث ما مثبت است، مثال زیر نشان می دهد که این مطلب همیشه هم درست نیست. به عبارت دیگر، **عکس قضیه قبل در حالت کلی درست نیست.**

آنها ~~نه~~ بحرانی




$$u^3 \rightarrow 3u^2 u'$$

$$f'(u) = 3(u-1)^2 = 0$$

$$u-1=0 \Rightarrow u=1$$

f'	+	0	+
f	↗		↗



هر نقطه اکسترمم نسبی

نقطه بحرانی

نقطه بحرانی

ممکن است نقطه اکسترمم نسبی باشد.

ممکن است نقطه اکسترمم نسبی نباشد.




۱ جدول تغییرات تابع $f(x) = -x^2 - 2x$ در زیر آمده است که در آن با تعیین علامت f' ، بازه‌هایی که تابع f در آنها صعودی است و همچنین بازه‌هایی که نزولی می‌باشد، تعیین شده است. همچنین، اکستریم نسبی تابع در جدول مشخص شده است:

$$f'(x) = -2x - 2 = 0 \Rightarrow -2x = 2 \Rightarrow x = -1$$


$$f'(x) = 0 \rightarrow x = -1 \text{ طول نقطه بحرانی}$$

$$f(-1) = -(-1)^2 - 2(-1) = 1$$



x	$-\infty$	-1	$+\infty$
بازه	$(-\infty, -1)$		$(-1, +\infty)$
علامت f'	+		-
یکنوایی f	صعودی اکید		نزولی اکید
	$-\infty$	max نسبی	$-\infty$

با توجه به جدول، مشخص است که نقطه به طول (-1) ، ماکزیمم نسبی تابع است؛ چرا که رفتار تابع در این نقطه از صعودی اکید به نزولی اکید تغییر کرده است. با توجه به جدول و در صورت لزوم با یافتن نقاط دیگری از تابع، نمودار آن را رسم کنید.



$$f(x) = -x^2 - 2x$$

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-(-2)}{2(-1)} = -1$$


$$f(-1) = -1 + 2 = 1$$

	-2	-1	0
	0	1	0

۲ جدولی مشابه جدول بالا برای تابع $g(x) = x^3 - 3x^2$ رسم کنید که نقاط اکسترم نسبی تابع در آن مشخص شده باشد.

$$g'(x) = 3x^2 - 6x = 0$$

$$3x(x-2) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases}$$



$$g(0) = 0$$

$$g(2) = 2^3 - 3 \times 4 = 8 - 12 = -4$$

$\max(0,0)$ نسبی
 $\min(2,-4)$ نسبی

	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f		↗	↘	↗	
		$\cup_{\max}$	$\cap_{\min}$		

↗
 $\min$ نسبی

↖
 $\max$ نسبی

مثال‌های بالا از توابع پیوسته، این مطلب را القا می‌کنند که تغییر رفتار این گونه تابع‌ها در یک نقطه از صعودی بودن به نزولی بودن، نشان‌دهنده نقطه ماکزیمم نسبی آن تابع است. برای مینیمم نسبی هم می‌توان مطلب مشابهی را بیان کرد که در ادامه آمده است.

آزمون مشتق اول


فرض کنیم c طول نقطه بحرانی تابع f باشد که f در c پیوسته است و همچنین f در یک همسایگی محذوف c مشتق‌پذیر باشد.

الف) اگر علامت f' در $x=c$ از مثبت به منفی تغییر کند، آنگاه $x=c$ طول نقطه ماکزیمم نسبی تابع f است.


ب) اگر علامت f' در $x=c$ از منفی به مثبت تغییر کند، آنگاه $x=c$ طول نقطه مینیمم نسبی تابع f است.

پ) اگر f' در c تغییر علامت ندهد؛ به طوری که f' در یک همسایگی محذوف c همواره مثبت (یا همواره منفی) باشد، آنگاه f در c ماکزیمم یا مینیمم نسبی ندارد.


درستی آزمون مشتق اول را در همسایگی نقطه c در هر یک از نمودارهای زیر مورد توجه قرار دهید.




$x=c$: طول ماکزیمم نسبی



$x=c$: طول مینیمم نسبی



$x=c$: نه طول ماکزیمم نسبی است
و نه مینیمم نسبی



$x=c$: نه طول ماکزیمم نسبی است
و نه مینیمم نسبی

اکسترمم های مطلق تابع

فعالیت

نمودار زیر نشان دهنده تغییرات دمایی برای یک شهر در طی ۲۴ ساعت است.


الف) تابع مقابل در چه نقاطی ماکزیمم نسبی دارد؟ D, B

ب) مقادیر ماکزیمم نسبی تابع کدام اند؟ $۳۵, ۲۵$

پ) تابع در چه نقاطی مینیمم نسبی دارد؟ C, A

ت) مقادیر مینیمم نسبی تابع کدام اند؟ $۲۱, ۱۰$

دما (سانتی گراد)



با توجه به نمودار، دیده می‌شود که دمای هوا در ساعت ۱۴ بیشترین مقدار و برابر با ۳۵ درجه سانتی‌گراد بوده است. در این حالت می‌گوییم، نقطه $D(۱۴, ۳۵)$ ماکزیمم مطلق تابع است و مقدار ماکزیمم مطلق تابع برابر ۳۵ می‌باشد. نقطه مینیمم مطلق این تابع و همچنین مقدار مینیمم مطلق آن را بنویسید.


نقطه $(۴, ۱۰)$ مینیمم مطلق تابع است
مقدار مینیمم مطلق تابع برابر ۱۰ است.

تعریف: با فرض $c \in D_f$ ، نقطه $(c, f(c))$ ، یک نقطه ماکزیمم مطلق برای تابع f نامیده می‌شود، هرگاه به ازای هر x از D_f داشته باشیم $f(c) \geq f(x)$. در این حالت عدد $f(c)$ را مقدار ماکزیمم مطلق f روی D_f می‌نامیم.

تعریف: با فرض $c \in D_f$ ، نقطه $(c, f(c))$ ، یک نقطه مینیمم مطلق برای تابع f نامیده می‌شود، هرگاه به ازای هر x از D_f داشته باشیم $f(c) \leq f(x)$. در این حالت عدد $f(c)$ را مقدار مینیمم مطلق f روی D_f می‌نامیم.

در تابع صفحه قبل، اکسترم‌های مطلق تابع f یعنی نقاط A و D ، به ترتیب نقاط مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع هستند.

۱ با تکمیل جدول زیر، اکسترم‌های مطلق و نسبی تابع زیر و همچنین نقاط بحرانی آن را در نقاط مشخص شده تعیین کنید.



طول نقطه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
$\max$ مطلق	×	×	×	×	×	×	×	×	✓
$\min$ مطلق	×	×	×	×	×	×	✓	×	×
$\max$ نسبی	×	×	✓	×	✓	×	×	×	×
$\min$ نسبی	×	✓	×	✓	✓	×	✓	×	×
نقطه بحرانی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓

۲ به کمک رسم نمودار تابع، مقادیر اکسترمم نسبی و مطلق تابع‌های زیر را در صورت وجود تعیین کنید.

الف) $t(x) = x^3; x \in [-2, 1]$


$$f(-2) = -8$$

$$f(1) = 1$$

$$f'(x) = 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

	-2	0	1
f'	+	0	+
f	-8		1

max(1, 1) مطلق
min(-2, -8) مطلق



ب) $g(x) = -x^2; x \in [-2, 3]$

$$g(-2) = -(-2)^2 = -4$$


$$g(3) = -3^2 = -9$$

$$g'(x) = -2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

(0, 0) ماکزیمم مطلق، نسبی
min(3, -9) مطلق


	+	0	-
g'		0	
g		0	

ω_{max}




پ) $u(x) = \frac{1}{x}$

اکسترمم صفتی با نسبیت ندارد.



جواب ندارد. $u'(x) = -\frac{1}{x^2} = 0$

u'	-
u	↘



$$f(-2) = |4 - 1| = 3$$

$$f(3) = |9 - 1| = 8$$

تابع $f(x) = |x^2 - 1|$ را در بازه $[-2, 3]$ رسم کنید و با توجه به نمودار، نقاط اکسترمم مطلق را تعیین کنید.

$$y = x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

در فعالیت قبل دیده می شود که تابع پیوسته $f(x) = |x^2 - 1|$ در بازه بسته $[-2, 3]$ هم ماکزیمم مطلق دارد و هم مینیمم مطلق که این مطلب همواره درست است. همچنین مشاهده می شود که نقاط اکسترمم مطلق، در نقاط بحرانی تابع یا نقاط انتهایی بازه واقع اند. این موضوع نیز همواره درست است.

قضیه: فرض کنیم تابع f در بازه بسته $[a, b]$ پیوسته باشد. در این صورت f در این بازه هم ماکزیمم مطلق دارد و هم مینیمم مطلق.

قضیه فوق، تنها وجود اکسترم های مطلق توابع پیوسته را در بازه های بسته تضمین می کند و به روش یافتن این نقاط اشاره ای ندارد. مراحل یافتن اکسترم های مطلق تابع پیوسته f در بازه بسته $[a, b]$ به شرح زیر است:

- ۱- مشتق تابع را به دست آورده و نقاط بحرانی f را می یابیم.
- ۲- مقدار تابع را در هر یک از نقاط بحرانی و همچنین در نقاط انتهایی بازه محاسبه می کنیم.
- ۳- در مرحله ۲، بزرگ ترین عدد به دست آمده، مقدار ماکزیمم مطلق تابع و کوچک ترین آنها مینیمم مطلق تابع در بازه $[a, b]$ است.

مثال: نقاط اکسترم مطلق تابع $f(x) = 2x^2 + 3x - 12$ را در بازه $[-1, 3]$ تعیین کنید.

حل: ابتدا به کمک f' ، نقاط بحرانی تابع را به دست می آوریم.

$$f'(x) = 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{4}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$$

بنابراین نقاط به طول $-1, 1, 3$ ، نقاط بحرانی بازه $[-1, 3]$ است. $\Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}$ ❌

x	-1	1	3
$f(x)$	13	-7	45

$f_{\min}$ $f_{\max}$

با توجه به جدول، دیده می شود که بزرگ ترین مقدار برای تابع در بازه $[-1, 3]$ برابر 45 و کوچک ترین مقدار، مساوی -7 است. به همین دلیل، این دو مقدار به ترتیب مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع در این بازه اند.

تمرین



۱) بزرگ‌ترین بازه از $\mathbb{R}$ که تابع $f(x) = x^2 - 12x + 4$ در آن نزولی اکید باشد، کدام است؟ چرا؟

$$f'(x) < 0$$

$$f'(x) = 2x - 12 = 0$$

$$2x = 12 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow x = \pm 2$$

	-2	2
$f'(x)$	+	-
$f(x)$	↗	↘

نزولی اکید $[-2, 2]$

۲) با تشکیل جدول تغییرات تابع $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ، مشخص کنید تابع در چه بازه‌هایی صعودی اکید و در کدام بازه‌ها نزولی اکید است؟

$$g'(x) = \frac{-2x \times 1}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	-	
$g(x)$	↗	↘	

صعودی اکید $(-\infty, 0]$
نزولی اکید $[0, +\infty)$

۳ نقاط بحرانی توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ $\sqrt{u} \rightarrow \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

$$4-x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2 \rightarrow D_f = [-2, 2]$$

نقاط بحرانی: $-2, 2, 0$

$$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$f(-2) = 0$$

$$f(2) = 0$$

$$f(0) = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} (-2, 0) \\ (2, 0) \\ (0, 2) \end{array} \right\} \text{نقاط بحرانی:}$$

ب) $g(x) = x^3 + 3x^2 - 4$

$$g'(x) = 3x^2 + 6x = 0$$

$$3x(x+2) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x+2 = 0 \Rightarrow x = -2 \end{cases} \quad \text{نقاط بحرانی: } 0, -2$$

$$g(0) = -4$$

$$(-2, 0) \text{ و } (0, -4) : \text{نقاط بحرانی}$$

$$g(-2) = -8 + 12 - 4 = 0$$

پ) $h(x) = \sqrt[3]{x}$ $h(0) = 0$ $(0,0)$ نقطه بحرانی

فول نقطه بحرانی $\Rightarrow$ مشتق نامعین $x=0$ $h'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\frac{x^{\frac{1}{3}}}{x} = \frac{1}{x^{1-\frac{1}{3}}} = \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

۴ در هر یک از توابع زیر، ابتدا نقاط بحرانی تابع را به دست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی آن را در صورت وجود مشخص کنید.

الف) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 10$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 0$$

$$3(x^2 + 2x - 3) = 0$$

$$(x+3)(x-1) = 0 \quad \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

	-3	+
f'	+ 0 - 0 +	
f	↗ 17 ↘	↘ -14 ↗
	max نسبی	min نسبی

$$f(-3) = -27 + 27 + 27 - 10 = 17$$

$$f(1) = 1 + 3 - 9 - 10 = -14$$

$(-3, 17)$ max نسبی

$(1, -14)$ min نسبی

ب) $g(x) = -2x^2 + 3x + 12x - 9$

$$g'(x) = -4x^2 + 4x + 12 = 0$$

$$-4(x^2 - x - 3) = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-1 \end{cases}$$

	-1	2
g'	+ 0 - 0 +	
g	$\nearrow -14$	$\searrow 11$
	$\cup_{\text{max}}$	$\cap_{\text{min}}$

$$g(2) = \overbrace{-14}^{-4} + 12 + 24 - 9 = 11$$

$$g(-1) = 2 + 3 - 12 - 9 = -14$$

$$(-1, -14)$$

max نسبی

$$(2, 11)$$

min نسبی

پ) $h(x) = -x^2 - 3x + 2$

$$h'(x) = -2x^2 - 3 = 0$$

$$-2x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = -1.5$$

حساب ندارد

نقطه بحرین ندارد

۵) مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق توابع زیر را در بازه‌های مشخص شده، در صورت وجود به دست آورید.

الف) $f(x) = -2x^2 + 9x - 13$; $x \in [-1, 2]$

$$f'(x) = -4x + 9 = 0$$

$$-4x(x - 3) = 0 \begin{cases} x=0 \quad \checkmark \\ x=3 \quad \times \end{cases}$$

x	-1	2	0
$f(x)$	-2	7	-13
		مقدار max مطلق	مقدار min مطلق

مقدار min مطلق برابر -13

مقدار max مطلق برابر 7

$$f(-1) = 2 + 9 - 13 = -2$$

$$f(2) = -16 + 36 - 13 = 7$$

$$f(0) = -13$$

ب) $g(x) = x^2 + 2x - 5$; $x \in [-2, 1]$

$$g'(x) = 2x + 2 = 0 \Rightarrow x = -1$$

جواب ندارد

۱، -۲: طول نقاط بحرانی

$$g(-2) = -1 - 4 - 5 = -10 \quad \text{مقدار min مطلق}$$

$$g(1) = 1 + 2 - 5 = -2 \quad \text{مقدار max مطلق}$$


مقدار max مطلق برابر -2

$$-10 = \text{min}$$

۶ اگر نقطه $(2, 1)$ ، نقطه اکسترمم نسبی تابع $f(x) = x^3 + bx^2 + d$ باشد، مقادیر b و d را به دست آورید.

$$f'(x) = 3x^2 + 2bx$$



$$f(2) = 1 \Rightarrow 1 + 4b + d = 1 \quad *$$



$$f'(2) = 0 \Rightarrow 3 \times 4 + 2b(2) = 0 \Rightarrow 12 + 4b = 0 \Rightarrow 4b = -12 \Rightarrow \underline{b = -3}$$

$$* 1 + 4(-3) + d = 1 \Rightarrow \underline{d = 11}$$

۷ نمودار تابعی مانند f با دامنه $\mathbb{R}$ را رسم کنید به طوری که هر نقطه دلخواه از D_f ، یک نقطه بحرانی f باشد. مسئله چند جواب دارد؟



نمونه سوالات نهایی



۱- بزرگترین بازه از $\mathbb{R}$ که تابع $f(x) = -2x^3 + 6x + 11$ در آن صعودی اکید باشد را با استفاده از جدول تغییرات بیابید.
(خرداد ۱۴۰۲ - ۱/۵ نمره)


$$f'(x) = -6x^2 + 6 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

	-1	1	
f'	-	+	-
f	↘	↗	↘

معدنی‌الیه $[-1, 1]$

۲- نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x^3 + bx^2 + d$ به صورت مقابل رسم شده است. مقادیر b و d را بیابید.
(دی ۱۴۰۱ - ۱/۵ نمره)

$$f'(x) = 3x^2 + 2bx$$



$$f'(2) = 0 \Rightarrow 12 + 4b = 0 \Rightarrow b = -3$$

$$f(2) = 1 \Rightarrow 8 + 4b + d = 1$$

$$8 - 12 + d = 1 \Rightarrow d = 5$$

سوالات تکمیلی



(سراسری تجربی ۱۴۰۳ نوبت اول)

مقدار مینیمم نسبی تابع $y = x^3 - 12x + 2$ ، کدام است؟

-۷ (۴)

-۹ (۳)

-۱۱ (۲)

-۱۴ (۱) ✓

$$y' = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$


	-2	2
f'	+ 0 -	0 +
f	↗	↘ ↗

min

$$f(2) = 1 - 24 + 2 = -14$$

نمودار تابع $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ به صورت زیر است. طول نقطه مینیمم نسبی تابع کدام

(سراسری تجربی ۱۴۰۱)



$$f(0) = 4 \Rightarrow c = 4 \quad | \quad f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$$f'(0) = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax = 0$$

$$x(3x + 2a) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{2a}{3} \end{cases}$$

$$-\frac{2a}{3} \rightarrow -\frac{2(-3)}{3} = 2$$

است؟

1/2 (۱)

2 (۲) ✓

3/2 (۳)

2 (۴)

$$f(-\frac{2a}{3}) = 0 \Rightarrow \frac{-1a^3}{27} + a \times \frac{4a^2}{9} + 4 = 0$$

$$\frac{-a^3}{27} = -4 \Rightarrow a^3 = -27 \Rightarrow a = -3$$


درس دوم

بهینه سازی

افراد در طول روز کارهای بسیاری انجام می دهند؛ به جاهای مختلفی می روند، از وسایل متنوعی استفاده می کنند، خرید می کنند، درس می خوانند و ... در تمام این فعالیت ها، هدف آن است که بهترین تصمیم ها اتخاذ گردند. به عنوان مثال، مدیر یک شرکت تولیدی همواره به دنبال آن است که بیشترین سود را با صرف کمترین هزینه کسب نماید. یا اینکه یک باغدار را در نظر بگیرید که با استفاده از روش های نوین کشاورزی، درصدد آن است که با صرف کمترین هزینه، بیشترین مقدار محصول را از واحد سطح برداشت کند. چنین مسئله هایی در زمره مسائل بهینه سازی هستند که برخی از آنها به کمک مشتق قابل حل اند. در اینجا مسائلی را با هدف ماکزیم کردن مساحت، حجم، سود یا مینیم کردن فاصله، زمان و هزینه بررسی خواهیم کرد.

فعالیت

۱ فرض کنید ۱۴ چوب کبریت در اختیار داشته باشیم و طول هر کدام از آنها را یک واحد در نظر بگیریم. با استفاده از همه این چوب کبریت ها، مستطیل می سازیم. نتیجه کار در سه حالت مختلف در شکل زیر آمده است:



الف) در هر سه حالت، محیط مستطیل ها ثابت و برابر 14 ... واحد است.

ب) در این مستطیل های هم محیط، دیده می شود که مساحت ها برابر نیستند و به ترتیب برابر 10 ، 6 و 12 ... واحد مربع هستند.

پ) مشاهده می شود که هرچه قدر اندازه طول و عرض یک مستطیل به هم نزدیک تر می شود، مساحت آن افزایش می یابد.

۲ جدول زیر را مورد توجه قرار دهید که در آن ابعاد و مساحت چند مستطیل با محیط ۱۴ واحد آمده است.

ابعاد مستطیل	$0/5 \times 6/5$	1×6	2×5	$2/5 \times 4/5$	3×4	$3/2 \times 3/8$	$3/5 \times 3/5$
محیط مستطیل	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
مساحت	$3/25$	۶	۱۰	$11/25$	۱۲	$12/16$	$9/25$

الف) در این جدول، بزرگ‌ترین عددی که برای مساحت مستطیل دیده می‌شود، $12/16$ است. اگر برای طول و عرض مستطیل تنها به اعداد طبیعی محدود نباشیم، آیا می‌توانید مستطیل دیگری با محیط ۱۴ واحد ارائه کنید که مساحت آن از عدد $12/16$ واحد مربع هم بزرگ‌تر باشد؟
 ب) برای حالتی که مساحت مستطیل بزرگ‌ترین مقدار ممکن می‌شود، چه حدسی می‌زنید؟
 درستی نتیجه‌ای را که در این فعالیت حدس زدیم، در مثال بعد با استفاده از مشتق بررسی می‌کنیم.

مثال ۱: نشان دهید در بین تمام مستطیل‌های با محیط ثابت ۱۴ سانتی‌متر، مستطیلی بیشترین مساحت را دارد که طول و عرض آن هم‌اندازه باشند.

حل: فرض کنیم ابعاد مستطیل x و l باشند. کمیتی که قرار است ماکزیم شود، مساحت مستطیل است:

$$S = x \cdot l \quad (1)$$

برای آنکه S به صورت تابعی از x بیان شود، می‌توانیم l را بر حسب x به دست آوریم:

$$P = 14 : \text{محیط مستطیل}$$

$$2(x + l) = 14 \Rightarrow x + l = 7 \Rightarrow l = 7 - x \quad (2)$$

با جایگذاری رابطه (۲) در (۱) خواهیم داشت:

$$S(x) = x(7 - x)$$

$$S(x) = -x^2 + 7x, \quad x \in [0, 7]$$

S در بازه $(0, 7)$ مشتق‌پذیر است، بنابراین برای یافتن نقاط بحرانی آن کافی است ریشه معادله $S'(x) = 0$ را بیابیم.

بنابراین نقاط به طول $3/5$, 7 , 0 ، نقاط بحرانی بازه $[0, 7]$ است.

$$S'(x) = 0 \Rightarrow -2x + 7 = 0 \Rightarrow x = 3/5$$


جدول تغییرات تابع S در بازه موردنظر به شکل زیر است:

x	۰	$3/5$	۷
$S'(x) = -2x + 7$	+	۰	-
$S(x) = -x^2 + 7x$	۰	$12/25$ ماکزیمم مطلق	۰

$$S(3/5) = -(3/5)^2 + 7(3/5) = 12/25$$


از جدول دیده می شود که بیشترین مقدار مساحت، $12/25$ سانتی متر مربع است و این مقدار زمانی حاصل می شود که طول و عرض مستطیل هم اندازه و مساوی $3/5$ سانتی متر باشند؛ یعنی یک مربع به ضلع $3/5$ سانتی متر داشته باشیم. نمودار تابع S نیز رسم شده است. به نقطه ماکزیمم S در نمودار آن توجه کنید.

مساحت مستطیل (سانتی متر مربع)



تذکر: در مثال قبل، تابعی که به دنبال مقدار اکسترمم مطلق آن بودیم، یک تابع درجه ۲ بود. از پایه های قبل هم می دانستیم که نقطه $(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a})$ ، نقطه اکسترمم تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ را به دست می دهد. اما همیشه تابع های موردنظر، درجه ۲ نیستند. با این حال، مراحل کار مشابه مثال قبل خواهد بود. مثال های بعد را مورد توجه قرار دهید.

$$S = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$$



مثال ۲: ورق فلزی مربع شکلی به طول ضلع ۳۰ cm را در نظر بگیرید. مطابق شکل می‌خواهیم از چهار گوشه آن مربع‌های کوچکی به ضلع x برش بزنیم و آنها را کنار بگذاریم. سپس با تا کردن ورق در امتداد خط‌چین‌های مشخص شده در شکل، یک جعبه دریا بسازیم. مقدار x چقدر باشد تا حجم قوطی، حداکثر مقدار ممکن گردد؟

حل: ارتفاع مکعب حاصل مساوی x است. طول و عرض قاعده آن را با l نمایش می‌دهیم. آنچه قرار است ماکزیمم شود، مقدار حجم مکعب مستطیل است:

$$V = x \cdot l^2$$

باید l را برحسب x در این رابطه قرار دهیم تا V تابعی یک متغیره از x شود.

$$2x + l = 30 \Rightarrow l = 30 - 2x \Rightarrow V = x(30 - 2x)^2$$

$$V(x) = x(900 - 120x + 4x^2) \Rightarrow V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x, \quad x \in [0, 15]$$

نقاط بحرانی تابع $V(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$V'(x) = 0 \Rightarrow 12x^2 - 240x + 900 = 0 \Rightarrow x^2 - 20x + 75 = 0$$

$$\Rightarrow (x-5)(x-15) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ x=15 \end{cases}$$



بنابراین نقاط به طول ۵، ۰، ۱۵، نقاط بحرانی بازه $[0, 15]$ است.

جدول تغییرات تابع V در بازه مورد نظر به صورت زیر است:

x	۰	۵	۱۵
$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900$	۰	+	-
$V(x)$	۰	۲۰۰۰	۰

ماکزیمم مطلق

با توجه به جدول، بیشترین حجم ممکن برای مکعب مستطیل مورد نظر، (2000 cm^3) است که به ازای $x = 5 \text{ (cm)}$ حاصل می‌شود.



$V = \text{مساحت مربع} \times \text{ارتفاع}$



$$V = (r_0 - rx)^2 \times x \quad x \in (0, 1)$$

$$V = (900 - 120x + 4x^2) \times x = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

$$V' = 12x^2 - 240x + 900 = 0$$

$$12(x^2 - 20x + 75) = 0 \Rightarrow (x-5)(x-15) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=10 \end{cases}$$


$$V(0) = (r_0 - rx_0)^2 \times x_0 = 0$$



math-pilevar.ir

مثال ۳: می‌خواهیم مخزنی به شکل مکعب مستطیل در باز بسازیم که حجم آن 10 m^3 بوده و طول کف مخزن دو برابر عرض آن باشد. قیمت مصالح مورد نیاز جهت کف این مخزن برای هر متر مربع 100 هزار تومان و این قیمت برای دیواره‌ها در هر متر مربع 60 هزار تومان است. عرض کف مخزن چقدر باشد تا هزینه مصالح مصرف شده کمترین مقدار ممکن گردد؟

حل: لازم است هزینه مصالح مصرف شده کمترین مقدار ممکن شود. تابع هزینه را به شکل زیر می‌توان نوشت:



$$\begin{aligned} C &= 100(x \cdot l) + 60[2xh + 2lh] \\ &= 100xl + 120h(x + l) \\ &= 100x(2x) + 120h(x + 2x) \\ C &= 200x^2 + 360xh \quad (1) \end{aligned}$$

لازم است که C را به شکل تابعی یک متغیره از x بنویسیم.

$$V = 10 (\text{m}^3) \Rightarrow x \cdot l \cdot h = 10 \Rightarrow x(2x)h = 10 \Rightarrow h = \frac{5}{x^2} \quad (2)$$

با جایگذاری رابطه (۲) در (۱) خواهیم داشت:

$$C(x) = 200x^2 + 360x \left(\frac{5}{x^2} \right) \Rightarrow C(x) = 200x^2 + \frac{1800}{x} \quad x \in (0, +\infty)$$

نقطه بحرانی تابع $C(x)$ را به دست می‌آوریم:


$$C'(x) = 0 \Rightarrow 400x + \frac{-1800}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{400x^3 - 1800}{x^2} = 0 \Rightarrow 400x^3 - 1800 = 0 \Rightarrow x^3 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[3]{4/5} = 1/65(m) \quad (C \text{ تابع بحرانی})$$

برای رسم جدول تغییرات تابع C ، لازم است مشتق آن یعنی $C'(x) = \frac{400x^3 - 1800}{x^2}$ را تعیین علامت کنیم. علامت C' در هر بازه، همان علامت صورت مشتق یعنی $(400x^3 - 1800)$ است. چرا؟

x	0	$\sqrt[3]{4/5}$	$+\infty$
$C'(x)$		$-$	$+$
$C(x)$	$+\infty$	$\searrow \approx 1635$ مینیمم مطلق C	$\nearrow +\infty$

از جدول دیده می‌شود که اگر عرض قاعده مخزن برابر $\sqrt[3]{4/5} = 1/65(m)$ انتخاب شود، هزینه مصالح کمترین مقدار ممکن و حدود 1635 (برحسب هزار تومان)، یعنی $1,635,000$ تومان خواهد شد.



هزینه دیواره ها : ۴۰ هزار تومان
هزینه کف : ۱۰۰ هزار تومان

$$V = 10 \Rightarrow 2x^2 \times h = 10 \Rightarrow h = \frac{10}{2x^2} = \frac{5}{x^2}$$

$$S_{\text{کف}} = 2x \times x = 2x^2 \xrightarrow[\text{هزینه}]{\times 100} 200x^2$$

$$S_{\text{دیواره ها}} = 2(2x \times h) + x \times h \times 2 = 4xh + 2xh = 6xh \xrightarrow[\text{هزینه}]{\times 40} 240xh$$

هزینه کل = هزینه کف + هزینه دیواره ها

$$C(x) = 200x^2 + 240xh \xrightarrow{h = \frac{5}{x^2}} C(x) = 200x^2 + 240 \times 5 \times \frac{1}{x}$$

$$C(x) = 200x^2 + \frac{1200}{x} \Rightarrow C'(x) = \frac{400x^2}{1 \times x^2} - \frac{1200}{x^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{400x^3 - 1200}{x^2} = 0 \Rightarrow 400x^3 - 1200 = 0 \Rightarrow x^3 = \frac{1200}{400} = 3 = \sqrt[3]{27} \Rightarrow x = \sqrt[3]{3}$$

$$C(x) = 200 \times (\sqrt[3]{3})^2 + \frac{1200}{\sqrt[3]{3}} \approx 1435$$

	$\sqrt[3]{3}$
$C'(x)$	- 0 +
$C(x)$	1435

min

مثال ۴: غلظت یک داروی شیمیایی در خون، t ساعت پس از تزریق در ماهیچه از رابطه $C(t) = \frac{3t}{t^3 + 27}$ به دست می آید. چند ساعت پس از تزریق این دارو، غلظت آن در خون، بیشترین مقدار ممکن خواهد بود؟

حل: ابتدا نقاط بحرانی تابع C را به دست می آوریم.

$$C'(t) = \frac{3(t^3 + 27) - 3t^3(3t)}{(t^3 + 27)^2} = \frac{3 + 81 - 9t^3}{(t^3 + 27)^2} = \frac{-6t^3 + 81}{(t^3 + 27)^2} = 0 \Rightarrow -6t^3 = -81$$

$$C'(t) = 0 \Rightarrow 3(t^3 + 27) - 9t^3 = 0 \Rightarrow (t^3 + 27) - 3t^3 = 0 \Rightarrow t^3 = \frac{27}{2}$$


$$\Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{27}{2}} = 2/38 \text{ (ساعت)} \quad (\text{نقطه بحرانی تابع } C)$$

در $C'(t)$ ، علامت مخارج همواره مثبت است، پس علامت $C'(t)$ در واقع همان علامت صورت مشتق خواهد بود. بنابراین، جدول تغییرات تابع C به شکل زیر است:

t	0	$\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$	$+\infty$
$C'(t)$	$+$	0	$-$
$C(t)$	0	≈ 0.18	0

ماکزیمم مطلق C

با توجه به جدول، دیده می شود که $\frac{3}{\sqrt[3]{2}} = 2/38$ ساعت پس از تزریق، میزان غلظت دارو در خون، حداکثر میزان ممکن خواهد بود.



مثال ۵: آرتا درون قایقی در نقطه P قرار دارد که فاصله آن از نزدیک ترین نقطه ساحل یعنی نقطه A ، معادل ۳ کیلومتر است. او می خواهد به نقطه B در ساحل برسد که در ۸ کیلومتری A قرار دارد. فرض کنید سرعت حرکت قایق ۲ km/h و سرعت پیاده روی آرتا در ساحل ۴ km/h باشد. اگر او بخواهد در کوتاهترین زمان ممکن به B برسد، در چه نقطه ای از ساحل باید پیاده شده و به سوی B پیاده روی کند؟

حل: نقطه ای از ساحل را که آرتا پیاده می شود، D می نامیم. می دانیم اگر x مسافت طی شده با سرعت ثابت v در مدت زمان t باشد، رابطه $x = vt$ یا معادل آن $t = \frac{x}{v}$ برقرار است. بنابراین:

$$D \text{ تا } P \text{ مسیر: } t_1 = \frac{PD}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + 9}$$

$$B \text{ تا } D \text{ مسیر: } t_2 = \frac{DB}{4} = \frac{8-x}{4} = 2 - \frac{1}{4}x$$

$$B \text{ به } P \text{ زمان کل رسیدن: } t = t_1 + t_2$$

$$t(x) = \frac{1}{4}\sqrt{x^2 + 9} + \left(2 - \frac{1}{4}x\right) \quad x \in [0, 8]$$

به دنبال یافتن مقدار مینیمم مطلق t هستیم. نقطه بحرانی t را به دست می آوریم.

$$t'(x) = \frac{1}{4} \times \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{4} = \frac{2x - \sqrt{x^2 + 9}}{4\sqrt{x^2 + 9}}$$


$$t'(x) = 0 \Rightarrow 2x - \sqrt{x^2 + 9} = 0 \Rightarrow 4x^2 = x^2 + 9 \Rightarrow x = \sqrt{3} \approx 1/73 \text{ (km)}$$

بنابراین نقاط به طول $\sqrt{3}$, 0 , 8 ، نقاط بحرانی بازه $[0, 8]$ است.

جدول تغییرات $t(x)$ به صورت زیر است:

x	0	$\sqrt{3}$	8
$t'(x)$		-	+
$t(x)$	$3/5$	$\frac{8+3\sqrt{3}}{4} \approx 3/3$	$\frac{\sqrt{73}}{2} \approx 4/27$
بر حسب ساعت		مینیمم مطلق t	

از جدول ملاحظه می شود که اگر x یعنی فاصله D از A ، برابر $\sqrt{3} \approx 1/73$ کیلومتر انتخاب شود، زمان رسیدن آرتا از P به B کمترین زمان ممکن یعنی تقریباً $3/3$ ساعت معادل سه ساعت و ۱۸ دقیقه خواهد بود.



$$\text{سرعت} = \frac{\text{مسافت}}{\text{زمان}} \Rightarrow V = \frac{x}{t} \Rightarrow t = \frac{x}{V}$$

$$a^2 = 3^2 + x^2 \Rightarrow a = \sqrt{9+x^2}$$

$$t_{\text{پاروژدن}} = \frac{\text{مسافت پاروژدن}}{\text{سرعت}} = \frac{\sqrt{9+x^2}}{2}$$

$$t_{\text{بیادهدرس}} = \frac{\text{مسافت بیادهدرس}}{\text{سرعت}} = \frac{1-x}{4}$$

$$t' = t_{\text{پاروژدن}} + t_{\text{بیادهدرس}}$$

$$t = \frac{\sqrt{9+x^2}}{2} + \frac{1-x}{4} = \frac{1}{4} \sqrt{9+x^2} + \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$$

$$\sqrt{u} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$$

$$t'(x) = \frac{1}{4} \times \frac{x}{\sqrt{9+x^2}} - \frac{1}{4} = \frac{1 \times x}{4 \sqrt{9+x^2}} - \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{x - \sqrt{9+x^2}}{4\sqrt{9+x^2}} = 0 \Rightarrow x - \sqrt{9+x^2} = 0 \Rightarrow x = \sqrt{9+x^2} \quad \text{توان ۲}$$

$$x^2 = 9+x^2 \Rightarrow 3x^2 = 9 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

$$t = \frac{\sqrt{9+x^2}}{2} + \frac{1-x}{4}$$

$$t(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{9+3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3} + 1 - \sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3} + 1}{4}$$

	0	$\sqrt{3}$	1
$t'(x)$		-	+
$t(x)$		$\nearrow$	$\searrow$

min

۳ ساعت، ۱ دقیقه

$$0.13 \times 60 = 7.8$$

کار در کلاس

۱ می‌خواهیم یک قوطی فلزی استوانه‌ای شکل و در باز بسازیم که گنجایش آن دقیقاً یک لیتر باشد. ابعاد قوطی چقدر باشد تا مقدار فلز به کار رفته در تولید آن مینیمم شود.
حل: باید مساحت کل استوانه کمترین مقدار ممکن گردد.

$$\text{حجم استوانه } 1(\text{lit}) = 1000 \text{ cm}^3$$

$$\Rightarrow \pi r^2 h = 1000 (\text{cm}^3) \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

سطح جانبی + مساحت قاعده = S : مساحت کل استوانه

$$S(r) = \pi r^2 + 2\pi r h \Rightarrow S(r) = \pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{1000}{\pi r^2} \right) \Rightarrow S(r) = \pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

با یافتن نقطه بحرانی S و تشکیل جدول تغییرات آن، مشخص کنید که به ازای چه مقداری از r ، مقدار $S(r)$ مینیمم می‌گردد.

$$S'(r) = \frac{2\pi r^2 - 2000}{r^3} = 0 \Rightarrow \frac{2\pi r^3 - 2000}{r^3} = 0$$

$$\frac{0 \times r - 1 \times 2000}{r^3}$$

$$2\pi r^3 - 2000 = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{2000}{2\pi} = \frac{1000}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}} \approx 6.18 \text{ cm}$$

$$S\left(\sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}}\right) = \pi \times \left(\sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}}\right)^2 + \frac{2000}{\sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}}} =$$

r	$\frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$
S'	- 0 +
S	$\searrow \frac{2000}{\sqrt[3]{\pi}} \nearrow$

$$= \frac{\pi \times 100}{\sqrt[3]{\pi^2}} + \frac{2000 \sqrt[3]{\pi}}{1 \times \sqrt[3]{\pi^2}} = \frac{200\pi}{\sqrt[3]{\pi^2}} \times \frac{\sqrt[3]{\pi}}{\sqrt[3]{\pi}} = \frac{200 \times \sqrt[3]{\pi}}{\pi} = 200 \sqrt[3]{\pi}$$

۲ هزینه سوخت یک قطار در هر ساعت برای حرکت با سرعت v کیلومتر بر ساعت، برابر $۳۲۰v^۲$ تومان است. همچنین سایر هزینه‌ها برای هر ساعت، صرف‌نظر از سرعت قطار، برابر ۸۰۰۰۰۰ تومان می‌باشد. قطار با چه سرعتی حرکت کند تا هزینه آن در یک کیلومتر، کمترین مقدار ممکن باشد.

$$x=1$$

حل: اگر قطار با سرعت ثابت v کیلومتر بر ساعت حرکت کند، داریم:

$$\text{هزینه } t \text{ ساعت حرکت: } C = ۸۰۰۰۰۰t + (۳۲۰v^۲)t$$

$$\text{هزینه } x \text{ کیلومتر حرکت: } C = ۸۰۰۰۰۰\left(\frac{x}{v}\right) + (۳۲۰v^۲)\left(\frac{x}{v}\right) \xrightarrow{x=1}$$

$$\text{هزینه } ۱ \text{ کیلومتر حرکت: } C(v) = \frac{۸۰۰۰۰۰}{v} + ۳۲۰v$$


$$v = \frac{x}{t} \Rightarrow t = \frac{x}{v}$$

نقطه بحرانی تابع C را بیابید و با تشکیل جدول تغییرات آن، سرعت بهینه را پیدا کنید.

$$C'(x) = \frac{0 \times v - 1 \times ۸۰۰۰۰۰}{v^۲} + ۳۲۰ = -\frac{۸۰۰۰۰۰}{v^۲} + \frac{۳۲۰ \times v^۲}{1 \times v^۲} = 0 \Rightarrow \frac{-۸۰۰۰۰۰ + ۳۲۰ \cdot v^۲}{v^۲} = 0$$

$$-۸۰۰۰۰۰ + ۳۲۰v^۲ = 0 \Rightarrow v^۲ = \frac{۸۰۰۰۰۰}{۳۲۰} = ۲۵۰۰ \Rightarrow v = \pm \sqrt{۲۵۰۰} = \pm ۵۰$$

$$C(۵۰) = \frac{۸۰۰۰۰۰}{۵۰} + ۳۲۰ \times ۵۰ = ۱۶۰۰۰ + ۱۶۰۰۰ = ۳۲۰۰۰$$




۳ دو عدد حقیقی بیابید که تفاضل آنها ۱۰ باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.

$$x - y = 10 \Rightarrow y = x - 10 = 5 - 10 = -5$$

$$S = xy = x(x - 10) = x^2 - 10x$$

$$S'(x) = 2x - 10 = 0 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$$




۴ در برخی بناهای تاریخی کشورمان پنجره‌هایی وجود دارد که به شکل یک مستطیل و نیم دایره‌ای بر روی آن می‌باشد به طوری که قطر نیم دایره برابر با پهنای مستطیل است. اگر محیط یک چنین پنجره‌ای ۴/۵ متر باشد، ابعاد آن را طوری بیابید که بیشترین نوردهی را داشته باشد. حل: باید مساحت پنجره بیشترین مقدار ممکن باشد.

$$\text{محیط} = 4/5 \Rightarrow 2h + x + \frac{1}{2}(2\pi r) = \frac{9}{2}$$


$$\Rightarrow 2h + 2r + \pi r = \frac{9}{2} \rightarrow h = \frac{9}{4} - r - \frac{\pi r}{2}$$

مساحت پنجره: $S = \text{مساحت مستطیل} + \text{مساحت نیم دایره}$

$$S = xh + \frac{1}{2}(\pi r^2) \Rightarrow S(r) = 2r\left(\frac{9}{4} - r - \frac{\pi r}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi r^2 \Rightarrow S(r) = -\left(\frac{\pi+4}{2}\right)r^2 + \frac{9}{2}r$$



با پیدا کردن نقطه بحرانی S و تشکیل جدول تغییرات آن، مشخص کنید که به ازای چه مقداری از r ، مقدار $S(r)$ بیشترین مقدار ممکن می‌شود.



$$P = \frac{q}{r}$$

$$2r + 2h + \frac{\pi r}{2} = \frac{q}{r} \Rightarrow 2h = \frac{q}{r} - 2r - \frac{\pi r}{2} \Rightarrow h = \frac{q}{2r} - r - \frac{\pi r}{4}$$

$S' = \text{مساحت مستطین} + \text{مساحت نیم دایره}$

$$S = 2r \times h + \frac{\pi r^2}{2} = 2r \left(\frac{q}{2r} - r - \frac{\pi r}{4} \right) + \frac{\pi r^2}{2}$$

$$= \frac{q}{2}r - r^2 - \frac{\pi r^2}{4} + \frac{\pi r^2}{2}$$

$$S = \frac{q}{2}r - \frac{(\pi+4)r^2}{4}$$


$$-r - r + \frac{\pi}{4} = \frac{-\pi r - 4r}{4} = \frac{-(\pi+4)r}{4}$$

$$\frac{-\pi-4}{4} = -\frac{(\pi+4)}{4}$$

$$S'(r) = \frac{q}{2} - \frac{(\pi+4)r}{2} = 0 \Rightarrow \frac{q - (\pi+4)r}{2} = 0 \Rightarrow q - (\pi+4)r = 0 \Rightarrow$$

$$r = \frac{q}{\pi+4}$$

$$S = \frac{q}{2}r - \frac{(\pi+4)r^2}{4}$$




$$S\left(\frac{q}{\pi+4}\right) = \frac{q}{2} \times \frac{q}{\pi+4} - \frac{(\pi+4)}{4} \times \left(\frac{q}{\pi+4}\right)^2 =$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times q^2}{(\pi+4) \times 2} - \frac{\frac{1}{4} q^2}{(\pi+4)} = \frac{\frac{1}{4} q^2}{(\pi+4)}$$

تمرین

۱ کشاورزی می خواهد دور یک مزرعه مستطیل شکل به مساحت ثابت ۱۰۰۰۰ متر مربع را دیوارکشی کند. هزینه هر متر دیوارهای شمالی و جنوبی ۲ میلیون تومان و هزینه هر متر دیوارهای شرقی و غربی ۸ میلیون تومان است.
الف) هزینه مورد نیاز برای انجام این کار را به صورت یک تابع بنویسید.
ب) ابعاد مزرعه چقدر باشد تا هزینه دیوارکشی به حداقل مقدار ممکن برسد؟



$$xy = 10000 \Rightarrow y = \frac{10000}{x} = \frac{10000}{200} = 50$$

$$\text{دیوار شمالی و جنوبی} = 2x \xrightarrow{\text{هزینه } \times 2} 2 \times 2x = 4x$$

$$\text{دیوار شرقی و غربی} = 2y \xrightarrow{\text{هزینه } \times 8} 2y \times 8 = 16y$$


$$\Rightarrow C = 4x + 16y$$

$$C(x) = 4x + 16 \times \frac{10000}{x} = 4x + \frac{160000}{x}$$

$$C'(x) = 4 + \frac{0 \times x - 1 \times 160000}{x^2} = \frac{4x^2 - 160000}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{4x^2 - 160000}{x^2} = 0 \Rightarrow$$

$$4x^2 - 160000 = 0 \Rightarrow 4x^2 = 160000 \Rightarrow x^2 = \frac{160000}{4} = 40000 \Rightarrow x = \pm 200$$

$$C(200) = 4 \times 200 + \frac{160000}{200} = 800 + 800 = 1600$$



۲ الف) می‌خواهیم کنار رودخانه یک محوطه به شکل مثلث متساوی‌الساقین را نرده‌کشی کنیم به طوری که قاعده مثلث منطبق بر رودخانه باشد. اگر تنها هزینه ۱۰۰ متر نرده را در اختیار داشته باشیم، در این صورت بیشترین مساحت ممکن برای این مثلث چقدر خواهد بود؟



$$S = \frac{1}{2} a \times b \sin \theta$$

ب) بدون استفاده از مشتق نیز، این مسئله را حل کنید.

$$50^2 = h^2 + x^2 \Rightarrow h^2 = 50^2 - x^2 \Rightarrow h = \sqrt{2500 - x^2}$$

$$S = \frac{h \times x}{2} = \frac{1}{2} x \sqrt{2500 - x^2} \rightarrow \sqrt{u} \rightarrow \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$S'(x) = \frac{1}{2} \sqrt{2500 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{2500 - x^2}} = \frac{\sqrt{2500 - x^2}}{2} - \frac{x^2}{\sqrt{2500 - x^2}} = 0$$


$$\frac{2500 - x^2 - 2x^2}{2\sqrt{2500 - x^2}} = 0 \Rightarrow 2500 - 3x^2 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 2500 \Rightarrow x^2 = \frac{2500}{3} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{2500}{3}} = \pm 25\sqrt{\frac{4}{3}}$$


$$x = \pm \sqrt{1250} = \pm 25\sqrt{2}$$

$$S(25\sqrt{2}) = 25\sqrt{2} \times \sqrt{2500 - 1250}$$

$$= 25\sqrt{2} \times 25\sqrt{2} = 425 \times 2 = 850$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 \times \sin \theta = \frac{2500}{2} = 1250$$






۳ ابعاد مستطیلی با بیشترین مساحت را تعیین کنید که دو رأس آن روی محور x ها و دو رأس دیگرش بالای محور x ها و روی سهمی $y = 12 - x^2$ باشند.

$$y = 12 - x^2 = 8 \quad 2x = 2 \times 2 = 4$$

$$S = 2x \times y = 2x \times (12 - x^2) = 24x - 2x^3$$

$$S'(x) = 24 - 4x^2 = 0 \Rightarrow 4x^2 = 24 \Rightarrow x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm \sqrt{6}$$

$$x = 2$$




$$S(2) = 2 \times 2 \times (12 - 4) = 4 \times 8 = 32$$

ابعاد مستطیل برابر 2×8 خواهد بود.

math-pilevar.ir

۴ هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب جیبی، شامل یک متن با مساحت ثابت 32 cm^2 خواهد بود. هنگام طراحی قطع این کتاب، لازم است حاشیه‌های بالا و پایینی هر صفحه 2 cm و حاشیه‌های کناری هر کدام یک سانتی‌متر در نظر گرفته شوند. ابعاد صفحه را طوری تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب کمترین مقدار ممکن باشد.



$$x \times y = 32 \Rightarrow y = \frac{32}{x} \rightarrow y = \frac{32}{x} = 4$$

$$S = (x+4)(y+2) = (x+4)\left(\frac{32}{x} + 2\right)$$

$$S(x) = 32 + 2x + \frac{128}{x} + 4 = 36 + 2x + \frac{128}{x}$$

$$S'(x) = 2 + \frac{0 \times x - 1 \times 128}{x^2} = \frac{2x^2 - 128}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{2x^2 - 128}{x^2} = 0 \Rightarrow$$


$$2x^2 - 128 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{128}{2} = 64 \Rightarrow x = \pm 8 \rightarrow x = 8 \text{ (چون)}$$

$$x+4 = 8+4 = 12$$


$$y+2 = 4+2 = 6$$

ابعاد صفحه برابر ۶، ۱۲ خواهد بود

$$S(8) = 12 \times 6 = 72$$



۵ آروین می خواهد به ایستگاه اتوبوسی برود که در ۲۰۰ متری غرب و ۶۰ متری شمال موقعیت فعلی او بعد از پارک قرار دارد. او می تواند با سرعت ۳ متر بر ثانیه از پیاده رو کنار پارک به سمت غرب برود. همچنین، می تواند از درون پارک و تنها با سرعت ۲ m/s عبور کند. با توجه به شکل، مقدار x را طوری تعیین کنید که او در کمترین زمان ممکن به ایستگاه برسد.



$$V = \frac{x}{t} \Rightarrow t = \frac{x}{V}$$

$$a^2 = x^2 + 60^2 \Rightarrow a = \sqrt{x^2 + 3600}$$

$$t_1 = \frac{\text{مسافت درون پارک}}{\text{سرعت درون پارک}} = \frac{\sqrt{x^2 + 3600}}{2}$$

$$t_2 = \frac{\text{مسافت کنار پارک}}{\text{سرعت کنار پارک}} = \frac{200 - x}{3}$$

$$\Rightarrow t = t_1 + t_2$$

$$t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3600}}{2} + \frac{200 - x}{3} = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 3600} + \frac{200}{3} - \frac{1}{3}x$$

$$t'(x) = \frac{1}{2}x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3600}} + \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$$

	0	$24\sqrt{5}$	200
t'		-	+
t			

$\searrow 10\sqrt{5} + \frac{200}{3} \nearrow$
min

$$\frac{x}{2\sqrt{x^2 + 3600}} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2\sqrt{x^2 + 3600} = 3x \xrightarrow{\text{توان ۲}} 4(x^2 + 3600) = 9x^2$$

$$4x^2 + 14400 = 9x^2 \Rightarrow 5x^2 = 14400 \Rightarrow x^2 = \frac{14400}{5} = 2880 \Rightarrow x = \pm 24\sqrt{5} \Rightarrow x = 24\sqrt{5}$$

$x \approx 52.97$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3400}}{2} + \frac{200 - x}{2}$$

$$f(10\sqrt{d}) = \frac{\sqrt{100d + 3400}}{2} + \frac{200 - 10\sqrt{d}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{4900}}{2} + \frac{200}{2} - 10\sqrt{d}$$

$$= \frac{\sqrt{129400}}{2} + \frac{200}{2} - 10\sqrt{d}$$

$$= \frac{11\sqrt{400}}{2} + \frac{200}{2} - 10\sqrt{d}$$


$$= 10\sqrt{d} + \frac{200}{2}$$

math-pilevar.ir

نمونه سوالات نهایی



مطابق شکل زیر، نقطه A در ناحیه اول دستگاه مختصات روی منحنی $y = 12 - x^2$ قرار دارد. با استفاده از جدول تغییرات، مختصات نقطه A را چنان بیابید که مساحت مثلث قائم الزاویه OAB بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد. (خرداد ۱۴۰۳ - ۱/۷۵ نمره)



$$S = \frac{1}{2} \times x \times y = \frac{1}{2} x (12 - x^2)$$

$$S(x) = 4x - \frac{1}{2}x^3$$


$$S'(x) = 4 - \frac{3}{2}x^2 = 0 \Rightarrow \frac{3}{2}x^2 = 4$$

$$x^2 = \frac{12}{3} = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \sim x = 2$$

$$A(x, y) = (2, 8)$$

$$y = 12 - x^2 = 12 - 4 = 8$$

$$S = \frac{2 \times 8}{2} = 8$$



سوالات تکمیلی



اگر مساحت بزرگ‌ترین مستطیلی که دو رأس آن بر محور x ها و دو رأس دیگر آن، یکی بر $y = \sqrt{x}$ و دیگری بر $y = \sqrt{a-x}$ واقع است برابر $\sqrt{2}$ باشد، مقدار a کدام است؟


(سراسری تجربی ۱۴۰۳ نوبت دوم)

۲ (۴)

۳ (۳) ✓

۴ (۲)

۶ (۱)



$$S = \sqrt{u} \times (a - 2u) \xrightarrow{t = \sqrt{u}}$$

$$S = t(a - 2t^2) = ta - 2t^3$$

$$S' = a - 6t^2 = 0 \Rightarrow t^2 = \frac{a}{6} \rightarrow t = \sqrt{\frac{a}{6}}$$

$$S = \sqrt{\frac{a}{6}} \left(a - 2 \times \frac{a}{6} \right) = \sqrt{\frac{a}{6}} \times \frac{2a}{3} = \sqrt{2} \quad \text{توان ۲}$$

$$\frac{a}{6} \times \frac{2a}{3} = 2 \Rightarrow \frac{a^2}{9} = 2 \Rightarrow$$

$$a^2 = 2 \times 9 \Rightarrow a^2 = 18 \Rightarrow a = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$